



Laurimaxi

O máximo da α -monolaurina



- Fonte de alta concentração de α -monolaurina
- Potencializa o desempenho
- Melhora ganho de peso e conversão alimentar dos animais
- Resultados comprovados, em diferentes condições de produção



Fique por dentro do mundo Feedis

Feedis
PAIXÃO POR ALIMENTAR

MÁXIMA POTÊNCIA

Os glicerídeos de ácidos orgânicos são uma forma **eficiente** de garantir que o ácidos sejam disponibilizados somente à partir do intestino, já que são compostos estáveis. Suas ligações covalentes presentes resistem ao pH estomacal, passando de forma segura e protegida.



A α -monolaurina é resistente ao pH e à ação das lipases que são ativadas preferencialmente na posição 1,3 do triglicerídeo (Mu and Hoy, 2004), o que permite que α -monolaurina seja absorvida intacta pelas células e seja mais efetiva.

Fonte estável
de α -monolaurina



Estável nos processos de
peletização e extrusão



Ação pH
independente



Inodoro e
não corrosivo

A α -monolaurina é um forte aliado para melhorar o desempenho em aves (Fortuoso, 2019) e suínos onde promove a recuperação das vilosidades intestinais (Zhang 2022).

Indicações de Uso: Aditivo melhorador de desempenho. | **LAURIMAX®** - De 1 a 2 kg/ton para frangos de corte, leitões em fase de creche e suínos em crescimento e terminação. | **Apresentação:** Sacos de 25Kg.