

Villonat[®]

Uma linha completa de glicerídeos de ácido butírico



Alta concentração de tributirina
Potencializa o desempenho de animais jovens



Mono, Di e Triglicerídeos de Ac. Butírico
Alta concentração de α -mono butirina



A combinação perfeita = tributirina + α -mono butirina
Para todas as fases e diferentes desafios



Fique por dentro do mundo Feedis

Feedis
PAIXÃO POR ALIMENTAR

LINHA COMPLETA PARA TODOS OS DESAFIOS

Os glicerídeos de ácido butírico da **FEEDIS** são fontes concentradas de ácido butírico, que fornecem nutrientes e estimulam o desenvolvimento dos enterócitos, favorecem uma microbiota mais saudável e potencializam o desempenho.

- 💧 Aumenta a digestibilidade dos nutrientes
- 💧 Favorece uma microbiota saudável
- 💧 Potencializa o desempenho
- 💧 Efeito comprovado no desempenho dos animais



α Monoglicerídeo

GLYCEROL

**FATTY
ACID**

1,3 Diglicerídeo

GLYCEROL

**FATTY
ACID**

**FATTY
ACID**

Triglicerídeo

GLYCEROL

**FATTY
ACID**

**FATTY
ACID**

**FATTY
ACID**

Os glicerídeos de ácidos orgânicos são uma forma **eficiente** de garantir que o ácido butírico seja liberado somente a partir do intestino, já que são compostos estáveis.

Suas ligações covalentes presentes resistem ao pH estomacal, passando de forma segura e protegida, para que sejam hidrolisadas somente pela ação da lipase.



- 💧 Eficiente na liberação de ácido butírico nos intestinos
- 💧 Ação pH independente
- 💧 Inodoro e não corrosivo
- 💧 Estável nos processos de peletização e extrusão

Indicações de Uso: Aditivo melhorador de desempenho. | **VILLONAT®** - De 1 a 2 kg/ton para frangos de corte e leitões em fase de creche | **VILLONAT MONO®** - De 1 a 2 kg/ton para frangos de corte, aves de postura e leitões em fase de creche | **VILLONAT PLUS®** - De 1 a 2 kg/ton para frangos de corte, leitões em fase de creche e suínos em crescimento e terminação. | **Apresentação:** Sacos de 25Kg.